

核准日期：2011 年 08 月 29 日

修改日期：2018 年 01 月 04 日

修改日期：2018 年 08 月 21 日

威澳®

## 丹参川芎嗪注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

### 【药品名称】

通用名称：丹参川芎嗪注射液


汉语拼音：Danshen Chuanxiongqin Zhusheye

### 【成份】

丹参、盐酸川芎嗪；辅料为甘油、注射用水。

化学名称：本品为复方制剂，其组份为：盐酸川芎嗪（化学名称为：2, 3, 5, 6-四甲基吡嗪盐酸盐）；丹参素[化学名称为： $\beta$  - (3, 4-二羟基苯基) 乳酸]。

化学结构式：



盐酸川芎嗪分子式： $C_8H_{12}N_2 \cdot HCl \cdot 2H_2O$

盐酸川芎嗪分子量：208.69

丹参素分子式： $C_9H_{10}O_5$

丹参素分子量：198.17

### 【性状】

本品为浅黄色至棕黄色的澄明液体。

### 【适应症】

用于闭塞性脑血管疾病，如脑供血不全，脑血栓形成，脑栓塞及其他缺血性心血管疾病，如冠心病的胸闷、心绞痛、心肌梗塞、缺血性中风、血栓闭塞性脉管炎等症。

### 【规格】

5ml

### 【用法用量】

静脉滴注，用 5%~10%葡萄糖注射液或生理盐水 250ml~500ml 稀释，每次 5~10ml。

### 【不良反应】

以下不良反应主要来自于丹参川芎嗪注射液上市应用后的国家药品不良反应监测系统反馈数据。其它同类产品，说明书中亦有下列大多数的不良反应。包括：

**全身性疾病及给药部位各种反应：胸部不适、寒战、发热。**

**皮肤及皮下组织类疾病：皮疹、瘙痒症、红斑。**

**免疫系统疾病：过敏反应，偶有喉水肿、速发过敏反应性休克的报道。**

**各类神经系统疾病：头晕、头痛。**

**胃肠系统疾病：恶心、呕吐、胃肠疾病。**

**呼吸系统、胸及纵隔疾病：呼吸困难。**

**血管与淋巴管类疾病：潮红、曾有静脉炎的报道。**

**心脏器官疾病：心悸。**

### 【禁忌】

1、脑出血及有出血倾向的患者忌用。

**2、对本品过敏者禁用。**

### 【注意事项】

1、静脉滴注速度不宜过快。儿童及老年患者用药应按儿童及老年剂量使用。

**2、糖尿病患者用药可在医生指导下使用。**

**3、若出现不良反应，遵医嘱。**

4、如有结晶析出，用温水加热溶解即可。

### 【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚不明确。

### 【儿童用药】

尚不明确。

**【老年用药】**

尚不明确。

**【药物相互作用】**

不宜与碱性注射剂一起配伍。

**【药物过量】**

尚不明确。

**【药理毒理】**

有抗血小板聚集，扩张冠状动脉，降低血液粘度，加速红细胞的流速，改善微循环，并具有抗心肌缺血和心肌梗死的作用。

**【药代动力学】**

尚不明确。

**【贮藏】**

遮光，密闭，在阴凉处(不超过 20℃)保存。

**【包装】**

玻璃安瓿装，5ml×5 支/盒。

**【有效期】**

暂定 24 个月

**【执行标准】**

WS-10001-(HD-1138)-2002-2017

**【批准文号】**

国药准字 H22026448

**【生产企业】**

企业名称：吉林四长制药有限公司

生产地址：吉林省梅河口市珠江路北段

邮政编码：135000

电话号码：0435-6918345

传真号码：0435-6918417

